

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

D.L.P. 23-10-72 33936

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

Abonnement Annuel
Nouveau Tarif : 30 F

SUPPLEMENT N° 1 au BULLETIN 145 d'OCTOBRE 1972

19 octobre 1972/n° 26

ARBORICULTURE FRUITIERE

Rectificatif au bulletin n°25 du 11 octobre 1972. Les bactérioses à Pseudomonas des rosacées fruitières : nous remercions nos lecteurs qui ont rectifié d'eux-mêmes le début du texte. Il fallait en effet lire : les arbres à fruits à noyau sont souvent atteints, dans notre région, par la bactériose *Pseudomonas syringae* et *Pseudomonas mors prunorum*, plus spécialement sur pruniers ...

Traitement d'automne des arbres fruitiers :

Sur pommiers, un premier traitement cuprique est à effectuer dès la fin de la récolte, à la dose de 500 g de cuivre métal par hl. Une seconde application sera entreprise avant la chute totale du feuillage à la dose de 500 g à 1000 g de cuivre métal/hl.

Ces traitements visent à protéger les arbres contre les contaminations du chancre à *nectria* (*N. galligena*) = chancre européen du pommier, dangereux sur toutes variétés et plus spécialement sur variétés rouges. Rappelons que les risques de contamination sont d'autant plus marqués que le temps est humide.

Il est souhaitable de couper dès maintenant les branches trop chancreuses ou mortes, de gratter les chancres pouvant être guéris et de désinfecter toutes plaies à l'aide de baumes arboricoles tels que Santar, Kankertox, Quino-Chancre.

GRANDE CULTURE

Grosse altise du colza d'hiver ou altise à tête dorée :

Les conditions climatiques de septembre et de début octobre se sont révélées peu favorables à la concentration des insectes sur les jeunes colzas. Les arrivées, très échelonnées, se sont poursuivies jusqu'à ces derniers jours.

Bien que l'altise à tête dorée paraisse en régression depuis deux années, il importe d'observer les cultures par journée chaude, ensoleillée. L'attention portera de préférence sur les bordures des pièces, éventuellement situées dans la direction de colza d'hiver de l'année précédente.

Examiner les jeunes plantes mais également le sol en observant, pour chaque point de notation, plusieurs minutes d'immobilité.

Intervenir dès que l'on remarque en moyenne 2 altises par m².

Les insecticides habituellement mis en oeuvre étant moins actifs par température relativement basse, les utiliser à dose maxima.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire CHAMPAGNE,

J. DELATTRE.

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE - Directeur-Gérant L. BOUYX

P406